


“APLICACIÓN URBANA”  
**V E S E R I S**<sup>™</sup>

**CONTRAC**<sup>®</sup>  
**BLOX**<sup>™</sup> 10 GRS



**Bromadiolona**  
Rodenticida / Bloque parafinado

 **Bell**  
LABORATORIES, INC.  
3699 Kinsman Blvd.  
Madison, WI 53704 U.S.A.  
[www.belllabs.com](http://www.belllabs.com)



**CONTENIDO NETO: 1.8 kg**

**PRECAUCIÓN**  
“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES  
DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR  
LA SECRETARIA DE SALUD”

040324/05-17  
Product Code: 65418

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”**

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación del producto (overol impermeable, guantes de PVC, goggles, mascarilla contra polvo o mascarilla completa con cartucho respiratorio). Mantenga el producto bien tapado en su empaque original. No use el producto en corrientes de agua.

**“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”**

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE MANIPULANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA, O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA”**

**“PRIMEROS AUXILIOS”**

Si ha habido contacto con la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, con supervisión médica siempre que sea posible, induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia).

**“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”**

**Grupo químico del producto:** Hidroxicoumarinas.

**Antídoto:** Administrar vitamina K<sub>1</sub>.

**Tratamiento específico.**- Administrar vitamina K<sub>1</sub>. Dosis adultos: 40 mg/día en varias formas. Dosis niños: 20 mg/día en varias formas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protrombina y niveles de hemoglobina.

El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y queden normales, y la hemorragia haya cesado.

**Signos y síntomas de intoxicación:** Al ser ingerido por seres humanos puede provocar diarrea y hemorragia por nariz y encías.

**“MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE”**

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADOS MÁS CERCA”.

**“APLICACIÓN URBANA”  
VESERIS™**

**CONTRAC BLOX™ 10 GRs**

**Bromadiolona**  
Rodenticida / Bloque parafinado  
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

**INGREDIENTE ACTIVO:** % EN PESO

Bromadiolona: 3-[3-(4-Bromo(1,1'-bifenil)-4-yl)-3-hidroxi-1-fenil-propil]-4-hidroxi-2H-1-benzopirran-2-ona (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg.)

NO MENOS DE: 0.005%

**INGREDIENTES INERTES:**

Cereales grado alimenticio, azúcar, aceite grado alimenticio, parafina, colorante azul.

NO MAS DE: 99.995%

Total: 100.000%

**CONTENIDO NETO: 1.8 kg**



No. de Registro: RSCO-URB-RODE-511-308-033-0-005  
NO CIVO EN CASO DE INGESTION  
NO CIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

Importado y distribuido por:  
**SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V.**

Villa Primavera No. 640 Int. 3  
Col. Villas de Lindavista, C.P. 64540  
Monterrey, Nuevo León.

R.F.C. SEC 910827 4PO

Tels: (55) 5271 2990 / 5515 8893

www.pestweb.com.mx | contacto@pestweb.com.mx

Formulado Por:

**Bell LABORATORIES, INC.**  
3699 Kinsman Blvd,  
Madison, WI 53704 U.S.A.  
www.belllabs.com  
“Hecho En E.U.A.”

**“INSTRUCCIONES DE USO”**

**CONTRAC BLOX** es un rodenticida de acción anticoagulante. Utilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (*Rattus rattus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus*) de la siguiente forma:

PLAGA	GRADO DE INFESTACIÓN	NO. DE BLOQUES / PUNTO DE CEBADO	OBSERVACIONES
Ratas	LIGERA A MODERADA	2 a 6	Colóquese la cantidad de cebo indicada por punto de cebado o directo a madriguera cada 5 a 10 m.
Rata Noruega Rata negra	SEVERA	8 a 16	
RATONES Ratón doméstico		2	Colóquese la cantidad de cebo indicada cerca del nido o cada 3 a 4 metros de distancia.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Inmediata.

**Métodos para preparar y aplicar el producto**

Determinese los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo: dentro de las madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los roedores y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspeccionense las áreas tratadas. Al tercer día repóngase el cebo consumido. Manténgase una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones. Posteriormente repítase el tratamiento a intervalos semanales, hasta que descienda el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños. Para prevenir reinfestaciones, establézcanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación, repítase el tratamiento.

El uso de cebaderos herméticos de la línea Protecta® incrementa la seguridad del producto y evita el desperdicio. Donde se repitan reinfestaciones, continuas, colóquese cebaderos en forma permanente y repóngase el cebo cada vez que sea necesario. Inscríbase sobre los cebaderos la leyenda: PRECAUCIÓN RODENTICIDA.

Frecuencia de aplicación: Repetir la aplicación en caso de reinfestación.

**CONTRAINDICACIONES**

Este producto es un cebo de aplicación directa. Manéjese los cebos con guantes. No se deben mezclar con insecticidas o ningún otro producto, para evitar el rechazo de cebo por los roedores.

**“GARANTÍA”**

**SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C. V.** garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con éste producto se obtengan.

Número de lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad:



**PRECAUCIÓN**

